

## **U W A G A**

### **Informacja na temat pryszczycy!**

Pryszczycza jest zakaźną i zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphanovirus należący do rodziny Picornaviridae.

Ludzie są wrażliwi na zakażenie, jednakże pryszczycza u ludzi nie jest śmiertelna i zwykle przebiega łagodnie. Ludzie zarażają się w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym zwierzęciem, jak również spożywając mięso, mleko i przetwory mleczne pochodzące od zakażonego zwierzęcia.

Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby u zwierząt powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, **związane w konieczności z wybicciem zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.**

W celu ochrony stada przed wniknięciem wirusa pryszczycy należy pamiętać, żeby zwierzęta wprowadzane do niego pochodziły z wiadomego źródła i były zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny.

#### Objawy pryszczycy u zwierząt

- okres inkubacji: 14 dni;
- pęcherzyki i pęcherze występujące w jamie gębowej, na wargach, języku, w okolicy otworów nosowych oraz na wymieniu, strzykach, w szparze międzyracicowej i na koronkach racic, po ich pęknięciu – nadżerki;
- temperatura ciała podwyższona o 1,5 - 2,50°C;
- apatia;
- obfite ślinienie, otwieranie jamy ustnej z charakterystycznym cmokaniem, utrudnione przeżuwanie i utrata łaknienia - w szczególności u bydła;
- spadek mleczności aż do całkowitego zaniku;
- kulawizna jednocześnie na wiele kończyn, sztywny chód;
- niewielka śmiertelność zwierząt wśród dorosłych;
- zwierzęta młode (cielęta, prosięta, jagnięta) są bardzo wrażliwe i często padają z powodu zapalenia mięśnia sercowego bez innych oznak choroby.

W razie zauważenia wymienionych objawów, niezwłocznie zgłosić przypadek powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii leczącemu Państwa zwierzęta. Do czasu przybycia weterynarza zatrzymać chore zwierzęta w oborze, odizolować je od pozostałych zwierząt oraz unikać wchodzenia osób obcych do gospodarstwa. Zaleca się, aby domownicy nie opuszczali gospodarstwa.

**Apelujemy do rolników o przestrzeganie wszystkich zasad i zachowanie nadzwyczajnych środków prewencji ale również ubezpieczenie stad zwierząt gospodarskich, aby uniknąć strat materialnych w przypadku wystąpienia pryszczycy.**

Szybkie rozpoznanie choroby stanowi pierwszy i najważniejszy etap jej zwalczania!